Plaagkalender groenten

Deze kalender geeft een grafische weergave van de meest voorkomende plagen en hun tijden van piek- of verminderde activiteit. De grijze vierkantjes geven momenten aan waarop het onwaarschijnlijk is dat een bepaalde plaag enige merkbare activiteit vertoont (stadia in diapauze of winterrust). De kalender is slechts een ruwe leidraad want de activiteit van plagen kan door vele factoren worden beïnvloed, waaronder weersomstandigheden, de aanwezige voedselbronnen, natuurlijke vijanden, ...

Valtypes:
Lv = lokval (bevat lokstof)
Vp = vangplaat (in specifiek kleur)
Fv = feromoonval

Overwinteringsstadia:
p = pop
e = ei
a = adult
m = migrant
l = larve

--> kan soms voorkomen maar normaal in kleine hoeveelheden
--> komt vaker voor in deze periode, kans op schade is matig tot groot
--> grote kans op voorkomen en veel risico op schade in deze periode
--> quasi altijd aanwezig deze periode met veel schade

Gewasgroep	plaaginsect	# generaties/jaar	Vallen monitoring	Gewasinspecties	Overwinteringsstadium
KOOLGEWASSEN					
	Koolvlieg	3	Lv		p
	Koolwittevlieg	4-5	Vp	✓	a
	Melige koolluis	4-14		✓	e/a
	Groene perzikluis	6-20		✓	e/a
	Aardvlooien	1	Vp		a
	Koolgalmug	4-5	Fv		l
	Koolmot	3	Fv	✓	m
	Klein koolwitje	1-4		✓	p
	Groot koolwitje	1-4		✓	p
	Kooluil	2	Fv	✓	p/l
	Gamma-uil	1-4	Fv	✓	m
	Knollenbladwesp	2-3	Vp	✓	a
PREI / UI					
	Preimineervlieg	2	Vp	✓	p
	Trips	3-8	Vp		l/p
	Preimot	3	Fv	✓	a
	Preivlieg	1-3	Vp		p
WORTELEN					
	Wortelvlieg	3	Vp		p
	Mineerborstelmot	2		✓	a
(KNOL)SELDER					
	Wortelvlieg	3	Vp		p
	Selderijvlieg	2	Vp	✓	p
	Blindwantsen	1-3	Vp		a
Polyfage plagen					
	Bonenvlieg	2-4	Vp		p
	Aardrupsen	2	Fv	✓	l/p